



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

**Rhododendron
ponticum**

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:

Rhododendron ponticum


Brodorol i:

Gorynys Sbaen a de-ddwyrain
Ewrop, tuag at y Cawcasws.

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government



FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol



Effeithiau:

Mae rhododendron yn ffurfio dryslwyni tew sy'n cysgodi planhigion brodorol ac yn atal coedwigoedd brodorol rhag ail-dyfu. Mae Rhododendron yn wenwynig i anifeiliaid (gan gynnwys peillwyr) a phobl. Mae'n gallu dal clefydau sy'n effeithio'n negyddol ar goedwigoedd brodorol. Gwariodd **Parc Cenedlaethol Eryri** ei hun **£2.2 miliwn** rhwng 2018 a 2024 yn ei reoli.

Cynefin:

Yn tyfu ar briddoedd asidig, mawnaidd, neu dywodlyd mewn coetiroedd, rhostiroedd, bryniau creigiog, gerddi gwag a glannau afonydd.



Llwyn bytholwyrdd, gyda thrwch o ganghennau, sy'n lledu dros ardaloedd mawr. Cafodd ei gyflwyno i Brydain yn 1763 a'i gofnodi yn y gwyllt am y tro cyntaf erbyn 1849, ac mae bellach yn gyffredin iawn.



Sut mae'n lledaenu:

Mae hadau'n cael eu gwasgaru gan y gwynt a dŵr. Mae hefyd yn lledaenu drwy haenau o ganghennau ar y ddaear. Gall pob pen blodyn gynhyrchu rhwng tair mil a saith mil o hadau.

BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH


TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol



Mae dail mewn sbiral
ar ben y gangen.



Blaguryn blodyn.


10-15 o flodau siâp twmffat
lelog i biws yn y gwanwyn. Mae
gan bob blodyn bum petal.

Dail lledraidd gydag arwyneb uchaf
gwyrrdd llwm. 6-12cm o hyd.



Mae capsiwlau prenaidd yn
datblygu ar ôl blodeuo ac yn
cynnwys hadau.

Coesau prenaidd
hyd at 15cm mewn
diamedr a 5m o
uchder.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu


Helpu i atal y lledaeniad



Cael gwared ar blanhigion aeddfed trwy balu,
gan sicrhau eich bod yn tynnu'r gwreiddiau.



Dylid cael gwared ar eginblanhigion
drwy dynnu gyda llaw neu balu.



Peidiwch â chompostio pennau hadau adref,
defnyddiwch gyfleusterau gwastraff gardd y cyngor.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer
syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Handy tips

Deddfwriaeth

Mae *Rhododendron ponticum* wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o [Ddeddf Bywyd Gwylt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwylt.

Dylai garddwyr sy'n meddu ar y planhigyn hwn gymryd camau i helpu **atal ei ledaeniad** o'u gerddi i'r gwylt.

Rhywogaethau tebyg:

Ni ddylid ei gymysgu gyda rhywogaeth ymledol arall, coeden lawrgeirios (*Prunus laurocerasus*).

Syniadau am blanhigion amgen

Anfroddorol

Camelia gyffredin
(*Camellia japonica*)

Aeron y Nadolig 'Robin Goch'
(*Photinia* × *fraseri*)

Gwifwrnwydden Burkwood
(*Viburnum* × *burkwoodii*)

Coeden lawrgeirios

Gwifwrnwydden
Burkwood

BRIG

Lluniau: NWWT Lisa Toth a RHS Mark Winwood.

Darluniau: David Setter @doodleplant a starfishonline.co.uk

Gwybodaeth wedi'i chasglu gan GB NNSS, RHS a BSBI.