



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

**Cotoneaster
asgwrn
pysgodyn**

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Cotoneaster horizontalis

Brodorol i:
Dwyrain Asia

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Yn ymledu dros ardaloedd eang ac yn gallu gorchfygu rhywogaethau brodorol. Mae'n broblem benodol ar laswelltir calchfaen yng Ngogledd Cymru lle mae'n gorchfygu phlanhigion brodorol gan gynnwys *Cotoneaster cambricus*, sydd ond yn tyfu ar Ben y Gogarth. Gall hefyd groesi gyda phlanhigion cotoneaster eraill gan newid nodweddion y planhigyn.



Cynefin:

Glaswelltir creigiog, cloddiau rheilffyrdd, waliau gardd, clogwyni, glaswelltir calchfaen, chwareli, pyllau sialc, palmentydd a waliau.



Llwyn collddail, sy'n tyfu'n isel ac yn lledaenu, mae'n tyfu i hyd at 90cm o uchder a 1.5m o led. Mae mwyr coch yn dilyn blodau gwyn gydag arlliw pinc yn niwedd y gwanwyn. Mae cotoneaster asgwrn pysgodyn yn ddihangwr gerddi adnabyddus. Cafodd ei gyflwyno i Brydain tua 1880 ond mae ansicrwydd ynghylch pryd y cafodd ei gofnodi gyntaf yn y gwyllt.



Sut mae'n lledaenu:

Mae'n cael ei ledaenu gan adar sy'n bwyta'r mwyr ac yn gollwn hadau yn helaeth trwy eu baw.

BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol

Canghennau fflat, gyda phatrwm saethben.

Mae dail yn troi'n
goch yn yr hydref.

Mwyar coch o ddiwedd
yr haf tan y gaeaf.

Canghennau noeth yn y gaeaf.

Dail gwyrdd tywyll
sgleiniog bach.

BRIG

FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU


MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad



Dylid cael gwared ar y planhigyn drwy balu, cael gwared ar yr holl wreiddiau, gan gymryd gofal i gael gwared ar yr holl bridd gyda mwyar.



Cael gwared ar eginblanhigion drwy dynnu gyda llaw neu balu.

Peidiwch â chompostio mwyar adref, defnyddiwch gyfleusterau gwastraff gardd y cyngor.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth

Mae cotoneaster asgwrn pysgodyn wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o'r [Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwyllt. Dylai garddwyr gymryd mesurau i helpu atal y lledaeniad o'u gardd i'r gwyllt.

Rhywogaethau tebyg:

Ni ddylid ei gymysgu gyda llosgddraenen (*Pyracantha coccinea*).

Syniadau am blanhigion amgen

Brodorol

Celyn (*Ilex aquifolium*).

Anfrodorol

Coeden gwins Japan nad yw'n frodorol (*Chaenomeles japonica*).

Celyn



Coeden gwins Japan

BRIG